

Site, front page :



Mask hundar




Mask katter




Milbemax Vet



Resa med djur



Välkommen till vår guide för hur du behandlar ditt husdjur mot mask. Vi finns här för att hjälpa dig – dels med frågor om mask och med information om avmaskning av din katt eller hund.



Gratis guider

Klicka här för att ladda ner våra broschyrer med information om mask hos hundar och katter



Hur ofta ska jag avmaska min hund och katt

Läs mer om avmaskning för hund och katt

Milbemax kan köpas receptfritt på apoteket

Apoteket AB
Apovet
Apotek Hjärtat AB
Djurfarmacia AB
Apotea AB

LINK IN TOP LINE:

- [Mask hundar](#)
- [Mask katter](#)
- [Milbemax Vet](#)
- [Resa med djur](#)

LINK UNDER MASK HUNDAR:

- [Vilka maskar kan min hund få?](#)
- [Hur ofta bör jag avmaska min hund?](#)
- [Hur hanterar jag maskinfektioner?](#)
- [Valpar och mask](#)

LINK UNDER MASK KATTER:

- [Vilka maskar kan min katt få?](#)
- [Hur ofta bör jag avmaska min katt?](#)
- [Hur hanterar jag maskinfektioner?](#)
- [Kattungar och mask](#)

LINK UNDER MILBEMAX VET:

- [Milbemax Vet tuggtabletter till hundar](#)
- [Milbemax Vet till hundar](#)
- [Milbemax Vet till katter](#)

TEXT UNDER RESA MED DJUR:

Vilka maskar kan min hund få?



Här är en snabbguide till de vanligaste maskarna hos hundar:



Spolmask är den vanligaste inälvsmasken hos hund. Den smittar via ägg i hundars avföring eller genom larver i smittade bytesdjur.

Vid smitta med spolmaskägg hos vuxna hundar utvecklas larver som vandrar ut i kroppen där de ligger vilande. Vid dräktighet hos tiken aktiveras larverna och kan vandra över till foster i livmodern eller till valparna via modersmjölken. Många hundvalpar drabbas därför av mask tidigt i livet. Tiken återsmittas ofta när de följer sin instinkt att slicka valparna rena. Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade djur och kan överleva i upp till två år, långt efter det att själva bajset försvunnit! Hunden kan råka svälja ägg när den nosar runt i gräset eller få i sig larver om den äter upp en infekterad gnagare.

Om vuxna hundar smittas med larver utvecklas dessa i hunden till vuxna maskar som ger ifrån sig fler ägg och livscykeln fortsätter.

Hos valpar medför äggsmitta utveckling av larver som vandrar i kroppen (vanligen genom levern och lungorna). Smitta med mask från bytesdjur ger infektion i tarmen både hos vuxna och valpar.



Bandmasken lever i hundens tunntarm. Ett av symptomen som djurägaren kan se är små masksegment som kommer ut och ger irritation i området runt hundens anus, vilket kan få hunden att "åka på rumpan".

Bandmasken överförs via värdjur som loppor, sniglar, gnagare, fisk och vissa rovdjur. Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade djur och kan överleva upp till ett år. Om en hund får i sig de här djuren (till exempel om den äter gräs eller vid jakt) överförs infektionen till hunden.

Bandmaskägg kan också ätas upp av loppor och därefter utvecklas inne i lopporna. När hundarna putsar sig äter de upp lopporna och livscykeln fortsätter.

Vissa bandmaskar kan innebära en hälsorisk för människor, till exempel rävens dvärgbandmask som konstaterades i Sverige första gången 2011 och nu anses etablerad i den svenska naturen.

Rävens dvärgbandmask (*Echinococcus multilocularis*) förekommer hos räv och hund. Masken utvecklas i värdjurets tunntarm och utsöndrar ägg som via avföringen förorenar till exempel svamp och bär. Mellanvärderna, bland annat människa och smågnagare, smittas av ägg och kan via larvstadiet utveckla en blåsa i levern som skadar organet. Rävens dvärgbandmask finns i stora delar av Västeuropa, vanligast i Centraleuropa, där upp till varannan räv är infekterad inom vissa områden. Längre norrut är färre rävar smittade. Rävar med rävens dvärgbandmask finns inte bara i skogs- och jordbrukslandskap utan även i storstadsområden. Parasiten sprider sig allt mer i dessa områden och är etablerat i Danmark och nu även i Sverige.

[Läs mere om dvärgbandmask här](#)



Tropisk och vanlig Hakmask och **Piskmask** förekommer sällan hos svenska hundar. När de förekommer är det ofta i kennelmiljöer, hos import- eller jakthundar. Tropisk hakmask kan ge blodbrist och nedsatt allmäntillstånd då de suger blod från tarmslemhinnan. Vanlig hakmask ger mildare symptom men kan bli ett stort problem framförallt i kennelmiljöer. För att kunna orsaka sjukdom måste en stor mängd mask ackumuleras, vilket kan inträffa i till exempel kennlar. Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade hundar. Sedan sväljs de ner av andra hundar och livscykeln fortsätter. Larverna från den tropiska hakmasken kan borra sig in i hundens hud (oftast mellan trampdynorna) eller också får hunden dem i sig när den slickar rent tassarna efter en promenad. Valpar kan smittas av hakmask via modersmjölken. Piskmask kan orsaka irritation i ändtarmen.



Lungmask och **Fransk hjärtmask** Dessa maskar finnes i rävar. Hundar kan få i sig larver genom kontakt med infekterade sniglar eller grodor, till exempel om de äter sniglar eller slickar på gräs. Mindre infektioner med lungmask är i regel ofarliga men stor förekomst kan orsaka allvarliga lungproblem. Hjärtmask kan få mycket allvarliga konsekvenser för en smittad hund.

Lungmask (*Crenosoma*) leder till sjukdom i varierande grad. Smittade hundar kan vara tillsynesvis friska eller allvarligt sjuka. Vanliga symtom kan vara trötthet och torrhosta hos hunden. Fransk hjärtmask (*Angiostrongylus*) är i Danmark utbredd framförallt på Själland, men har även påträffats i andra delar av landet. I Sverige har det rapporterats fall där hund smittats på ön Sydkoster och i november 2012 har smitta konstaterats i mellersta Dalsland. Under 2013 konstaterades fyra fall i Sverige, alla hos hundar som inte varit ute och rest.



Hjärtmask (Tropisk hjärtmask) Hjärtmasken sprids av myggor och ger hosta och nedsatt aptit. En smitta med hjärtmask kan leda till allvarliga konsekvenser för hunden och i framskridna stadier är den dödlig. Risken för hjärtmask varierar mellan olika länder och är i Europa för närvarande begränsad till länderna i Syd- och Östeuropa. Infektionen kan förebyggas med månatlig behandling. Tala med din veterinär innan du tar med din hund utomlands.

Dvärgbandmask hos hund



Fynd av rävens dvärgbandmask i Sverige

I Sverige konstaterades rävens dvärgbandmask första gången 2011. Flera rävar, i Bohuslän, Katrineholm och Dalarna, konstaterades 2011-2012 vara infekterade av parasiten och nu har man även konstaterat smitta hos mellanvärdar och masken har därmed etablerat sig. Myndigheterna undersöker rävar, rävavföring och olika smågnagare för att följa spridningen av smittan. Jordbruksverket och SVA uppmanar ägare till hundar som ätit sork eller mus i aktuella kommuner att avmaska sina hundar regelbundet. På SVAs hemsida finns alltid aktuell information. Vad gäller regler angående resa med djur till andra länder, sök alltid uppdaterad information på Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se

Värt att veta om dvärgbandmask

Rävens dvärgbandmask (*Echinococcus multilocularis*) förekommer hos räv och hund. Masken utvecklas i värddjurets tunntarm och utsöndrar ägg som via avföringen förorenar till exempel svamp och bär. Mellanvärderna, bland annat människa och smågnagare, smittas av ägg och kan via larvstadiet utveckla en blåsa i levern som skadar organet. Rävens dvärgbandmask finns i stora delar av Västeuropa, i högst frekvens i alpområdet/Centraleuropa, där upp till varannan räv kan vara infekterad inom vissa områden. Längre norrut är färre rävar smittade. Rävar med rävens dvärgbandmask finns inte bara i skogs- och jordbrukslandskap utan även i storstadsområden.

Vuxna dvärgbandmaskar lever i värddjurets tarm och avger ägg som kommer ut med avföringen. Äggen äts upp av mellanvärderna, exempelvis sork och smågnagare. Hos dessa utvecklas en blåsmask, i första hand i levern, men andra organ kan också drabbas. Cirkeln är sluten när huvudvärden äter en sork med blåsmask och nya bandmaskar utvecklas i tarmen hos huvudvärden. Från att en konsumerad blåsmask utvecklas till en mogen bandmask som i sin tur avsöndrar nya ägg tar det minst 37 dygn. Rävar kan ha tusentals maskar i tarmen utan att vara sjuka.

Parasiten är svårbehandlad hos människor. I Europa dör ett antal människor varje år till följd av infektionen. Därför är det allvarligt att parasiten konstaterats i Sverige. Rävens dvärgbandmask har nu fått fotfäste i den svenska räv- och smågnagarstammen och då riskerar inte bara jägare utan alla som vistas ute i naturen att stöta på smittan. Hundar (och i mindre grad katter) som varit utomlands och utsatts för smittan och sedan inte avmaskas före ankomsten till Sverige löper stor risk att föra smittan vidare. De utsöndrar äggen med sin avföring precis som räven och äggen kan också sitta i pälsen på dem. Människor som hanterar smittade hundar (katter) och förvisso även rävar, riskerar att smittas av rävens dvärgbandmask.

Hos hund kan infektionen förebyggas och för att minska risken att människor smittas bör man undvika att äta bär o dyl direkt från naturen (Dvärgbandmaskägg kan normalt sköljas bort från bär och grönsaker).

Hundens dvärgbandmask

Det finns även ytterligare en bandmask: Hundens dvärgbandmask (*Echinococcus granulosus*) förorsakar blåsmasksjuka. Masken förekommer sparsamt i nordligaste Sverige men har på senare år minskat. Masken utvecklas i hundens tunntarm och utsöndrar ägg i avföringen som förorenar till exempel svamp och bär. Mellanvärd för den stam av parasiten som finns i Norden är ren och hjortdjur. När dessa smittas av hundens dvärgbandmask utvecklas ägget till en larv, som i sin tur transporteras främst till levern för att utvecklas till en blåsa (även lungan och andra organ i kroppen kan angripas).

Hur ofta bör jag avmaska min hund?



Hur ofta din hund bör avmaskas beror på hundens levnadssätt

Inälvsmask kan hunden få i sig på många ställen, på promenaden, i hemmet eller i trädgården. Det är svårt att hindra hunden från att komma i kontakt med smitta.

Många hundar har inga symtom på maskinfektion, din hund kan se alldeles frisk ut även om den har mask.

Valpar avmaskas före tre veckors ålder (avmaska tiken också). Därefter varannan vecka till två veckor efter avvänjning och sedan efter behov (tex en gång i månaden upp till sex månaders ålder).

www.esccap.org

Vuxna hundar avmaskas/undersöks vid tecken på mask, efter diagnos eller vid känd risk. Hundar med större risk att få mask är till exempel kennelhundar, brukshundar, jakthundar och hundar som reser.

Hundar som regelbundet får vistas lösa i skog och mark i områden där man funnit rävens dvärgbandmask bör avmaskas/undersökas regelbundet. Behandling var fjärde vecka (28 dagar) ger skydd mot rävens dvärgbandmask.

Vid resor: Avmaskning sker före inresa till vissa länder, bland annat till Norge och Finland. I områden med tropisk hjärtmask behandlas hunden förebyggande en gång per månad. Om du ska resa, sök alltid aktuell information på jordbruksverkets hemsida www.sjv.se

Om du är osäker på om din hund har mask kan du be din veterinär att undersöka den eller skicka in ett avföringsprov.

Hur hanterar jag maskinfektioner?



Så här hanterar du maskinfektioner

Genom regelbunden avmaskning minimerar du risken att hunden sprider maskägg i omgivningen. På så vis bidrar du till att minska risken för att människor och andra husdjur blir smittade.

Det finns flera sätt att skydda din hund och din omgivning mot spridning av mask:

- Avmaska/undersök hunden regelbundet – be apoteket eller veterinären rekommendera ett avmaskningsmedel som är effektivt mot alla de viktigaste masktyperna hos hundar.
- Låt behandlingen styras av hundens livsstil, prata med apoteket eller veterinären om hundens typiska beteende och var ni bor så att ni får en avmaskningsplan som passar just er.
- Ta upp hundbajset – det kan finnas maskägg i hundens avföring, så om du tar upp den kan du förebygga att maskägg sprids.
- Håll koll på loppor, en sorts bandmask kan infektera loppor och hundar kan lätt svälja loppor när de putsar sig.
- Låt inte hunden jaga på egen hand och inte heller äta eller smaka på döda djur, hundar kan infekteras av mask om de äter levande eller döda djur, som möss, fåglar och kaniner.
- Var noga med hygien, håll hundens sovplats och matskålar rena, tvätta händerna ofta och låt inte hunden slicka dig i ansiktet.
- Undervisa barnen om riskerna och låt dem inte stoppa smutsiga händer i munnen när de är i områden där det kan finnas smitta.
- Ät inte bär direkt från naturen (skölj först)

Valpar och mask



Valpar är särskilt känsliga för inälvsmask. Eftersom de är mer mottagliga, nyfikna och lekfulla än äldre hundar, löper de en större risk att smittas av infektioner i omgivningen. De har svårt att hantera en maskinfektion och får lättare tarmrubbingar och blir sjuka (lungproblem) på grund av att larverna vandrar genom kroppen efter äggsmitta. Många valpar föds med spolmask eller infekteras via modersmjölken. I svåra fall kan vissa masktyper vara dödliga för valpar. Eftersom valpar är så keliga och lekfulla har de ofta mer närkontakt med barn, vilket gör att risk för överföring av masksmitta till barn blir särskilt stor.

Symtom att hålla koll på

Här är några vanliga symtom på infektion med vanlig spolmask hos valpar:

- Hosta, andnöd
- Glanslös päls
- Tjock, rund buk
- Slöhet, blodbrist, diarré och/eller illamående
- Viktnedgång
- "Åker på rumpan" eller har masksegment runt ändtarmsöppningen

Infektion med andra maskar kan ge andra symtom, till exempel kan infektion med hjärtmask orsaka hosta, håglöshet, blödningar och död.

De bästa tipsen för att skydda valpen mot mask

Det är lätt att skydda din valp mot mask: Avmaska regelbundet – Var fjortonde dag från två veckors ålder till två veckor efter avvänjning och sedan en gång i månaden upp till sex månaders ålder*

- Plocka upp hundbajset så att maskarna inte sprids.
- Håll din valp kopplad i områden där det kan finnas smitta.
- Håll uppsikt på eventuella loppor för att hindra valpen från att äta infekterade loppor.
- Be apoteket eller veterinären rekommendera ett avmaskningsmedel som är effektivt mot alla vanligt förekommande maskar hos valpar.
- Behandla med relevant medel vid resa.

*Organisationen ESCCAP har detaljerade rekommendationer och instruktioner för maskbehandling

www.esccap.org

Vilka maskar kan min katt få?



Olika sorters maskar

Här är en snabbguide för de vanligaste maskarna hos katter:



• **Spolmask** är den vanligaste inälvsmasken hos katter. Den kan förekomma hos kattungar redan från fyra veckors ålder. Katten kan få dem i sig om den äter smittad jord eller infekterade värdjur som fåglar och möss. Symtomen kan bland annat vara hosta, glanslös päls, slöhet, diarré, viktnedgång och svullen buk. Spolmask kan även infektera människor – särskilt barn är utsatta. Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade djur och kan överleva i upp till två år, långt efter det att själva bajset försvunnit! Katten kan råka få i sig ägg när den nosar runt på marken. Äggen utvecklas till larver, som vandrar ut i vävnader och lungorna. Katten hostar sedan upp larven och den sväljs på nytt ner i magsäcken. Katten kan också få i sig larver om den äter en infekterad gnagare.



• **Bandmask** lever i kattens tunntarm. Ett av symtomen är masksegment runt kattens anus eller på sovplatsen. Bandmasken överförs via värdjur som loppor, gnagare och får och vissa bandmaskar kan innebära en allvarlig hälsorisk för människor. Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade djur och kan överleva i upp till ett år. De kan sväljas ner av gnagare som söker föda och som sedan infekterar katter som jagar. Bandmaskägg kan också ätas upp av loppor och därefter utvecklas inne i lopporna. När katterna putsar sig äter de upp lopporna och livscykeln fortsätter.



Hakmask Katter kan få i sig hakmask från smittad jord eller infekterade gnagare. Hakmasken lever av kattens blod och kan ge diarré, slöhet och viktnedgång. Vissa sorters hakmask kan även ge hudsjukdom hos människa. Larverna kan borra sig in i kattens hud (oftast på tassarna) eller så kan katten få dem i sig när den slickar tassarna.



• **Hjärtmask (Tropisk hjärtmask)** sprids av myggor. Infektion hos katter ger ofta inga symtom alls eller lindriga symtom från andningsvägarna som hosta, men kan i vissa fall bli så allvarlig att djuret plötsligt dör. Risken för hjärtmask varierar mellan olika länder och är i Europa för närvarande begränsad till länderna i Syd- och Östeuropa. Kontrollera med veterinären innan du tar med din katt utomlands. Hjärtmasken lever i hjärtat och artärerna hos infekterade djur. Medan de utvecklas släpper de ut mycket små larver i djurets blod, som sedan sväljs ner av myggor som suger blod från det infekterade djuret. Om myggorna sedan till exempel sticker din katt, för de infektionen vidare via sin saliv.



• **Lungmask** lever i kattens luftvägar. Smittade katter utsöndrar ett larvstadium av masken i avföringen. Symtom på smitta med lungmask kan vara hosta och andningsbesvär. Katter smittas med lungmask genom sniglar som har infekterats med lungmaskens larvstadium.

Hur ofta bör jag avmaska min katt?



Hur ofta din katt bör avmaskas beror på kattens livsstil

Det finns inälvsmaskar nästan överallt. Det är praktiskt taget omöjligt att hindra att katten kommer i kontakt med dem, oavsett om den håller sig hemma i trädgården eller strövar omkring på annat håll. Även om katten mest stannar inomhus finns det ändå en risk.

Många katter har inga symtom på maskinfektion, din katt kan se alldeles frisk ut även om den har en maskinfektion.

Om du är osäker på om din katt har mask kan du be din veterinär att undersöka den eller skicka in ett avföringsprov.

Vissa unga och vuxna katter har en livsstil som gör dem mer utsatta för smitta, till exempel de som jagar mycket behöver avmaskas regelbundet. Fråga veterinären om vilket intervall som är bäst för din katt.

Hur hanterar jag maskinfektioner?



Så här hanterar du maskinfektioner

Regelbunden avmaskning skyddar inte bara din katt eller kattunge. Den hjälper också till att skydda din familj och andra människor och husdjur genom att den minskar spridningen av maskäggs i omgivningen.

Det finns flera sätt att skydda din katt och din omgivning mot spridning av mask:

- Avmaska katten regelbundet – be apoteket eller veterinären rekommendera ett avmaskningsmedel som är effektivt mot alla de viktigaste masktyperna hos katter.
- Håll rent, ta bort bajset från kattlådan eller trädgården för att undvika spridning av mask.
- Håll koll på loppor, en bandmasksort kan infektera loppor och katter kan lätt svälja loppor när de slickar sig.
- Var noga med hygien, håll kattens sovplats och matskålar rena, tvätta händerna ofta och låt inte katten slicka dig i ansiktet.
- Undervisa barnen om riskerna och låt dem inte stoppa smutsiga händer i munnen när de är i områden där det kan finnas smitta. Lägg lock på barnens sandlåda när de inte leker där så att den inte kan användas som toalett av katter.

Kattungar och mask



Så här skyddar du din kattunge

Det är stor risk att en ny kattunge som du tar hem har mask eftersom de kan ha smittats via modersmjölken när de diar.

Symtom att hålla koll på

Här är några vanliga symtom på maskinfektion hos kattungar:

- Glanslös päls
- Hosta
- Tjock, rund buk
- Slöhet, blodbrist, diarré eller illamående
- Viktnedgång
- Masksegment runt ändtarmsöppning eller att kattungen tvättar sig mycket i det området.

De bästa tipsen för att skydda kattungen mot mask

Det är lätt att skydda kattungen mot mask:

- Avmaska regelbundet – en gång i månaden från tre veckors ålder till kattungen är tre månader ^{1,2,3}
- Plocka upp bajset från kattlådan eller i trädgården för att undvika spridning av mask.
- Försök få kattungen att inte äta döda djur
- Håll uppsikt på eventuella loppor för att hindra kattungen från att svälja infekterade loppor.
- Be veterinären rekommendera ett avmaskningsmedel som är effektivt mot alla vanligt förekommande maskar hos kattungar.

1. Milbemax bör inte ges till katter under 6 veckor.
2. SVA rekommenderar att kattungar avmaskas 2 ggr/år upp till två års ålder, därefter 1 ggr/år vid högt smitttryck.

3. ESCAAP, rekommenderar att kattungar avmaskas var 14:e dag från 3 veckors ålder till 2 veckor efter avvänjning. Därefter varje månad under 6 månader. Vuxna katter avmaskas/undersöks 4 ggr/år.

Milbemax Vet tuggtabletter till hundar



Med Milbemax kan du behandla hunden med en engångsdos mot de vanligt förekommande inälvsmask kombinationer. Tabletterna är små och få till antal för respektive viktklass. För samtliga indikationer för Milbemax - hänvisas till produktresumén (se längst ner). Förpackningar: 2 st tabletter. Storpack finns att få på recept.

Milbemax tuggtabletter till hundar - en tuggtablett

- Kycklingsmak
- Engångsdos
- Smak- och konsistens gör den lättare att ge till hunden än en vanlig tablett
- Milbemax tuggtabletter kan ges till hundvalpar från 2 veckors ålder och 1 kg
- Kan användas till dräktiga och digivande tikar

Små hundar / valpar	
1 - 5 kg	
Hundar	
5 - 25 kg	
25 - 50 kg	

[Se fullständig produktinformation på www.fass.se](http://www.fass.se)

Milbemax Vet till hundar



Med Milbemax behandlar du hunden med en engångsdos mot de vanligt förekommande inälvsmaskarna. Tabletterna är små och få till antal för respektive viktklass. För samtliga indikationer för Milbemax - hänvisas till produktresumén (se längst ner). Förpackningar: 2 st och 4 st (stor hund) tabletter. Storpack finns att få på recept.

Dosering

Små hundar och valpar 1 tablett/5 kg kroppsvikt

Hundar 1 tablett/25 kg kroppsvikt

Engångsdos enligt tabell:

Små hundar och valpar		Hundar	
0.5 - 1 kg	 1/4	5 - 25 kg	 1
1 - 5 kg	 1		
5 - 10 kg	 2	25 - 50 kg	 2

Hundar över 50 kg, kombinera rätt antal tabletter.

[Se fullständig produktinformation på www.fass.se](http://www.fass.se)

Milbemax Vet till katter



Med Milbemax behandlar du katten med en engångsdos mot de vanligt förekommande inälvsmaskarna. Tabletterna är små och få till antal för respektive viktklass. För samtliga indikationer för Milbemax - hänvisas till produktresumén (se längst ner). Förpackningar: 2 st och 4 st (stor katt) tabletter. Storpack finns att få på recept.

- Milbemax kan ges till kattungar från 6 veckors ålder och 0,5 kg
- Små tabletter med köttsmak
- Kan användas till dräktiga och digivande katter

Dosering

Små katter och kattungar 1 tablett/2 kg kroppsvikt

Katter 1 tablett/8 kg kroppsvikt

Engångsdos enligt tabell:

Små katter och kattungar		Katter	
0,5 - 1 kg	 1/2	2 - 4 kg	 1/2
1 - 2 kg	 1	4 - 8 kg	 1

Katter över 8 kg, kombinera rätt antal tabletter.

[Se fullständig produktinformation på www.fass.se](http://www.fass.se)

Resa med djur



Utlandsresor

Kan man ta med sig hunden eller katten när man reser?

Det finns många ställen utomlands dit man är välkommen att ta med sin hund eller katt och med lite planering är det inte särskilt krångligt.

Tänk på följande när du ska ta hunden eller katten med dig utomlands:

- ID-märkning med microchip (för djur märkta innan 3/7-2011 gäller även läslig tatuering. Datum för tatueringen skall framgå i passet)
- Dokumentation av att hunden eller katten har vaccinerats mot rabies i enlighet med lagstiftningen
- EU-pass för sällskapsdjur
- Kontrollera reglerna för in- och utförsel med Jordbruksverket på www.jordbruksverket.se

Kontakta din veterinär i god tid före resan för att kontrollera att du har gjort alla förberedelser som krävs.

Avmaskning

Om du ska ta med hunden eller katten på resa bör du rådfråga din veterinär om avmaskning behövs, eftersom det på många platser finns risk att din hund eller katt smittas av mask och i vissa fall även risk för vidare smitta till människa. Spridning av parasiter är ett allmänt problem och vi bör alla ta ansvar för att minska riskerna. Därför är det bra om du låter behandla ditt djur även om det inte är ett krav i det land eller de länder du ska resa till.

I vissa länder krävs att hundar och katter behandlas mot rävens dvärgbandmask innan de förs in i landet. För Storbritannien, Irland, Finland, Malta och Norge gäller att hunden måste behandlas 1-5 dagar före inresa. Avmaskningen ska göras med en produkt som innehåller prazikvantel eller epsiprantel och ska utföras av veterinär. Om du reser till Norge eller Finland regelbundet kan du i stället behandla djuret var 28:e dag.

Kraven ändras med jämna mellanrum. Kontrollera vad som är aktuellt på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se.

Infektionssjukdomar på resan

Det är viktigt att vara medveten om att hundar också kan smittas med andra infektionssjukdomar. En del av dessa ger inga symtom förrän långt efter att hunden har smittats och djurägaren ansvarar för att förebygga sjukdom. Innan du tar med hunden på resa bör du därför rådgröra med din veterinär om vad du kan göra för att minska risken för att hunden utsätts för smitta.

I Medelhavsområdet finns bland annat infektionssjukdomen leishmanios, som överförs till hund via sandmyggor. Leishmanios kan utvecklas till en allvarlig systemisk sjukdom som kan kräva livslång behandling. Därför bör hunden skyddas under resan med en produkt som förhindrar myggbett. Dessutom är det klokt att hålla hunden inomhus på kvällen och natten.

Kontakta din veterinär

Tala om för din veterinär vart du ska resa och hur länge du ska vara borta, så att ni kan komma överens om ett behandlingsprogram som både uppfyller lokala krav och ger hunden maximalt skydd.

Checklista inför resan

Be din veterinär göra en hälsoundersökning av din hund eller katt och se till att dess vaccinationer, avmaskningar och övriga behandlingar förs in i djurpasset. Du kan ha nytta av checklistan nedan inför resan.

- Är ditt djur tillräckligt friskt för att resa?
- Har djuret avmaskats?
- Har djuret det vaccinationsskydd som behövs?
- Är passet uppdaterat inför resan?
- Är djuret märkt med mikrochip?
- Är djuret försäkrat?
- Har du kontrollerat vilka lokala regler för hundar och katter som gäller på resmålet?
- Har du kontaktuppgifterna till din veterinär till hands? Mycket går att ordna per telefon.
- Har du frågat veterinären om det finns andra parasiter och infektionssjukdomar på resmålet som du bör vara uppmärksam på?

Tropisk hjärtmask Rävens dvärgbandmask

