

SENASTE NYTT

10 september 2021

Vetenskaplig uppdatering COVID19 och Smittsamhet och symptom vid genombrottsinfektioner efter vaccination/genomgången infektion med SARS-CoV-2. Lägerapporter från inbjuden panel. Fredag 24 september kl 16.30 – 18.00

COVID19 **NYHETER** Fredag 24 september kl 16.30 - 18.00 Uppföljande Webinarium, Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF). Moderator: Lars-Magnus Andersson verksamhetschef, Docent, överläkare Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, ordförande SILF 16.30 Välkomna 16.30 - 16.50 Vetenskaplig uppdatering COVID19, Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 16.50 - 17.00 Frågor/svar 17.00 - 17.20... [Läs mer](#)

31 augusti 2021

Lunchseminarieserie för läkare om precisionsmedicin

NYHETER Lunchseminarieserie om precisionsmedicin i sjukvården som **Genomic Medicine Sweden** (GMS) kommer att anordna under hösten. Seminarserien vänder sig till läkare och annan sjukvårdspersonal och syftet är att berätta mer om genetik och precisionsmedicin och dess betydelse framöver i kliniken. **Lunchseminarium: Helgenomanalys vid sällsynta diagnoser ger...** [Läs mer](#)

31 augusti 2021

Sepsismarschen – tillsammans mot sepsis

NYHETER Hjälp oss att stoppa sepsis! Nu kan ni som företag, organisation eller förening göra något meningsfullt tillsammans. Häng med på Sepsismarschen 2021 och hjälp oss att sprida kunskap om sepsis och samla in medel till forskningen.

[Visa alla nyheter](#)

NYHETSUPPDATERINGAR

Prenumerera på våra nyheter. Fyll i din e-postadress nedan.

E-postadress

Prenumerera



Läs senaste

Tidigare nummer

Mer

KREALKALKULATORER

LM reviderad
MDRD
Cockcroft-Gault

 Vill du bli medlem? Ansök här

PREVENAR 12, 10, 400-kat, 200A/02. Polyakardvaccin mot pneumokokinfektioner, koronar, adenovirus, 13-valent, 0,5 ml injektionslösning, suspension i 0,9% NaCl. **Prevenar** (polyakardvaccin) innehåller 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F och vardera 2,2 µg bakt. (0,5 ml 4,4 µg). **Indikationer:** För förebyggande av infektioner i blodet och i vätskor i örona, bihålorna och i lungorna hos personer som utsätts för infektioner i blodet och i vätskor i örona, bihålorna och i lungorna. **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Skadad eller annan skadad skall administrering av Prevenar 12 skiljer upp hos personer med akut sjukdom med hög feber.

